La Petite Mangouste indienne

Urva auropunctata (Hodgson, 1836)

Taxinomie: Ordre: Carnivore, Famille: Herpestidae

Description

Morphologie: plus petite des mangoustes asiatiques.

- Taille tête-queue : 25-37 cm (sans la queue), taille queue : 19,2-29 cm, poids de 305-662 g.
- Les mâles sont plus grands que les femelles (particulièrement pour les populations introduites).
- Pelage grisonnant de couleur chamois à gris foncé.
- Le crâne est allongé et étroit et le museau est pointu.
- Yeux petits avec iris brun. Les oreilles sont courtes.
 La queue est musclé à la base et se rétrécit tout jusqu'au bout.
- Cinq doigts à chaque patte avec des griffes non rétractiles

Biologie

Reproduction (en captivité): gestation d'environ 49 jours. Portée généralement de deux petits mais elle peut varier de 1 à 5 jeunes. 2 à 3 portées par an. Reproduction principalement en été. Naissance la nuit souvent après le coucher du soleil.

Régime alimentaire: omnivore avec tendance carnivore (Petits vertébrés: grenouilles, reptiles, oiseaux, rongeurs et invertébrés, insectes etc.).

Écologie et distribution

- Espèce diurne, rarement active par temps pluvieux.
- Elle vit dans les forêts denses, les buissons, les habitats ouverts et fréquente les habitations humaines.
- Répartition naturelle : sud-est de l'Asie, de l'Irak à l'Iran en passant par l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde, Népal et Bhutan, également au Bangladesh, Myanmar et sud de la Chine.
- Introduite dans de nombreuses îles, mais également Croatie, Cuba, Guyane Française, Guadeloupe, Martinique, Tanzanie.



Période d'observation en France : Observable tout l'année. Précision : absente en métropole mais présente en outre-mer (Saint-Martin, Guadeloupe, Martinique).

Interaction avec les activités humaines: La petite Mangouste indienne est attirée par les zones habitées par l'homme. Espèce prédatrice, elle a été introduite dans de nombreuses îles pour le contrôle d'animaux indésirables (rats, serpents venimeux, etc.) et aussi en tant qu'animal domestique. Espèce faisant l'objet d'un commerce important en Chine, Inde et Népal qui constitue une menace dans certaines partie de son aire de répartition naturelle.

Confusion possible:

En métropole : éventuellement avec des petits mustélidés de forme comparable mais l'espèce est actuellement absente du territoire métropolitain. En outre-mer, elle pourrait se confondre avec d'autres mangoustes si ces dernières étaient introduites (ex. *Urva edwardsii*).

Références: Gilchrist J.S., Jennings A.P., Veron G. & Cavallini P. (coord.) 2009. Family Herpestidae (Mongooses). Pp 262-329 in Wilson, D. E. & Mittermeier, R. A. eds. *Handbook of the Mammals of the World. Vol. 1. Carnivores*. Lynx Edicions, Barcelona.

Lorvelec, O., Pascal, M., Delloue X. & Chapuis J.-L. 2007. Les mammifères terrestres non volants des Antilles françaises et l'introduction récente d'un écureuil. *Terre et vie.* 20 p.